


Apéndice 2.4.4 Biodiversidad Herpetos. Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca Anamichu)

Rhynella typhonius (Linneaus, 1758)



Orden: ANURA

Familia: BUFONIDAE

Género: *Rhynella*

Especie: *Rhynella typhonius*

Nombre común: Sapo común


Categoría: No evaluado

Descripción: Puede medir entre 5 y 7 cm. de longitud rostro cloaca (LRC); Se caracteriza por la presencia de una cresta dorsolateral fuertemente desarrollada sobre la cabeza que se sitúa alrededor de la órbita, continúa hacia atrás sobre el tímpano, alcanzando la región posterior de la axila, en donde abarca las glándulas parotoideas y finalmente se extiende dorsolateralmente hasta la ingle terminando con pequeños gránulos; glándulas parotoideas subtriangulares, muy abultadas y cortas. Los machos presentan excrescencias nupciales.

Aspectos ecológicos: se encuentra asociada al bosque seco tropical, bosque Premontano, y ocasionalmente en bosques altoandinos, se puede hallar en áreas abiertas como bosques de galería. Usan microhábitat acuáticos y terrestres. Posee modo reproductivo 1, consistente en huevos y larvas que se desarrollan en cuerpos de agua lénticos, aunque puede variar de acuerdo con la disponibilidad del recurso hídrico.

Distribución: En Colombia la especie ha sido reportada en la región Andina, Pacífico y Orinoquía, se puede encontrar entre los 0 y 1900 m. Para el Departamento del Tolima, se ha encontrado en la cuenca del río Coello. En la cuenca del río Prado y en la cuenca del río Totare, al igual que en la cuenca del río Lagunillas. En la cuenca del río Anamichú, se colectó en la vereda El Porvenir del municipio de Rioblanco a 1360m.

Hypsiboas crepitans (Wied – Neuvied, 1824)



Orden: ANURA
Familia: HYLIDAE
Género: *Hypsiboas*
Especie: *Hypsiboas crepitans*
Nombre común: rana platanera


Categoría: No evaluado

Descripción: Esta especie puede medir entre 8.2 y 2.4 cm. de longitud rostro cloaca (LRC); Se caracteriza por presentar membrana palpebral densamente pigmentada, una ligera pigmentación en la porción lateral del cuerpo; piel del dorso lisa de color canela amarillo a naranja con algunas manchas café oscuras, piel del vientre granular, de color blanca con manchas amarillas claras. Dedos manuales con pequeñas membranas basales, presenta una espina prepical que aparece al retraer el prepollex en machos adultos; dedos pediales con extensas membranas interdigitales..

Aspectos ecológicos: se asocia al bosque seco tropical y al bosque premontano, es de carácter arborícola y microhábitat semiacuáticos. Generalmente se encuentra en áreas de alta intervención antrópica. Tiene modo reproductivo 3: postura de huevos en nidos naturales, artificiales, o en masas que se adhieren a la vegetación cerca del agua, y desarrollo de larvas en estanques o quebradas. Generalmente se encuentran grupos numerosos de individuos alrededor de estanques en comportamientos reproductivos.

Distribución: En Colombia la especie ha sido reportada para casi todo el territorio nacional. En el Departamento del Tolima, se ha encontrado en las cinco cuencas ya evaluadas (Coello, Prado, Amoyá, Totare y Lagunillas), en la cuenca del río Anamichú, se encontró en la localidad de Bocas de Anamichú en el municipio de Rioblanco a 400m.

Eleuterodactylus taeniatus



Orden: ANURA

Familia: BRACHYCEPHALIDAE

Género: *Eleutherodactylus*

Especie: *Eleutherodactylus uranobates*

Nombre común: Rana


Categoría: No evaluado

Descripción: organismo de tamaño mediano, con coloración crema en el dorso y ventralmente mas clara, presenta barras oscuras en el dorso de las extremidades posteriores, también algunas barras en los labios y generalmente el iris se presentaba de dos colores y la pupila redonda. Con discos en los dedos, sin membranas interdigitales visibles.

Aspectos ecológicos: Esta especie se caracteriza por encontrarse principalmente en las zonas cafeteras y zonas de potreros en poblaciones numerosas entre los 2200m y los 2800m.

Distribución: Se distribuye en la región andina principalmente en las zonas cafeteras, en el departamento del Tolima, se ha reportado en las cuencas mayores de los ríos Coello, Prado y Lagunillas. En la cuenca hidrográfica del río Anamichú se reporto en la vereda Porvenir del municipio de Rioblanco a 1360m.

Ninia atrata



Orden: SQUAMATA
Familia: COLUBRIDAE
Género: *Ninia*
Especie: *Ninia atrata*
Nombre común: cazadorcita


Categoría: No evaluado

Descripción: Especie relativamente pequeña, la cual no supera los 70 centímetros de longitud total, en su estado adulto se caracteriza por ser una serpiente completamente negra poco brillante y presenta una línea amplia sobre la cabeza de color rojo.

Aspectos ecológicos: Se encontró relacionada al bosque seco tropical cerca de una vía terrestre destapada sin ninguna cercanía a los cuerpos de agua de la región, es principalmente terrestre.

Distribución: Esta especie se distribuye en las zonas secas del país ascendiendo hasta bosque húmedo premontano. En el departamento del Tolima se ha reportado para la cuenca hidrográfica del río Coello, en la cuenca del río Anamichú se encontró en la vereda de Bocas de Anamichú a 400m., en el municipio de Rioblanco.

Anolis huilae




Orden: SQUAMATA
Familia: POLYCHROTIDAE
Género: *Anolis*
Especie: *Anolis huilae*
Nombre común: lagartito.
Categoría: No evaluado

Descripción: los machos de esta especie son de color verde pasto, o verde con varias manchas redondas amarilla sobre el dorso y los lados y algunas veces bandas negras en la cola. El vientre es de color gris o amarillo. La hembra es de color café pálido y oscuro o con barras transversales sobre el rostro, o con una banda vertebral café crema con puntos café oscuro. Organismos de tamaño mediana los cuales miden aproximadamente 81mm.

Aspectos ecológicos: habita principalmente los troncos y árboles de mediana altura, se pueden encontrar perchados en las ramas de estos en las noches relativamente tranquilos casi nunca relacionados con cuerpos de agua cercanos. Se encuentran principalmente en el bosque premontano.

Distribución: se distribuye principalmente en la región andina en los departamentos del Meta, Huila y Tolima. En el departamento se ha reportado en la cuenca del río Coello, en la cuenca del río Anamichú, se encontró en la localidad de Quebradon a 1600m. .

Anolis sp.



Orden: SQUAMATA
Familia: POLYCHROTIDAE
Género: *Anolis*
Especie: *Anolis sp.*
Nombre común: lagartito.
Categoría: No evaluado

Descripción: individuo de color café grisáceo con línea vertebral y sin presencia de bolsa gular visible, de tamaño relativamente pequeño no superior a los 15 centímetros.

Aspectos ecológicos: Se encontró en el bosque premontano específicamente perchado sobre el bosque de galería cerca de fuente hídrica de tipo 2 con presencia de potreros y zonas de cultivo.

Distribución: se encontró en la cuenca del río Anamichú en la vereda Quebradon en el municipio de Rioblanco a 1600m.