

Apéndice 2.17 PEQUEÑOS MAMÍFEROS

Rhipidomys latimanus Tomes, 1860



Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: *Rhipidomys*
Especie: *Rhipidomys latimanus*

Estado. Poco comunes

Descripción. Coloración dorsal castaña haciéndose más negrusca en la grupa. Pelo bicolor basalmente gris oscuro con las puntas castañas amarillentas. Pelaje suave, denso y mediano. Cabeza de similar coloración a la del dorso. Rostro alargado con orejas medianas a grandes ovaladas con pelos muy finos, cortos color ocre en su parte interna y negros, un poco más largos en su exterior. Ojos medianos, vibrisas abundantes y dirigidas incluso por encima de su cabeza. Presencia de tres vibrisas sobre sus ojos de diferentes tamaños. Cola ventral dorsalmente negra con pelos cortos desde su base que se presentan más abundantes hacia el final, formando un pincel de pelos en el extremo de la misma. La longitud de la cola mayor que la longitud cabeza-cuerpo. La coloración ventral es de color crema desde el inicio hasta las puntas. Manos y patas blancas con dedos ligeramente oscuros, plantas rosadas.

Aspectos ecológicos. Nocturnas; arborícolas; solitarias. Usan todos los niveles del bosque incluyendo a veces el suelo, pero pueden pasar la mayor parte del tiempo en el dosel. Parecen preferir áreas de vegetación densa de lianas. En la cuenca del río Totare se colectó en la base de los árboles, con gran cantidad de hojarasca y dosel cerrado.

Distribución. Elevación media de los Andes, entre 450-2200 m, en el O y C de Colombia, C de Ecuador, y extremo N de Perú.

***Rhipidomys fulviventor* Thomas, 1896**

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: *Rhipidomys*
Especie: *Rhipidomys fulviventor*



Estado. No aplica

Descripción. Coloración dorsal parda, clara leonada con tonos más oscuros en el lomo y la grupa, pelos con los $\frac{3}{4}$ basales grises oscuros y las puntas pardas; lateralmente con tonos amarillentos. Pelaje largo, suave, denso y casi lanoso. Cabeza de coloración similar al dorso, pero con los cachetes blancos que gradan a amarillento y anaranjado; rostro alargado; vibrisas muy alargadas que sobrepasan las orejas, negras. Orejas grandes, redondeadas, dirigidas hacia atrás y pardas claras. Manos enteramente claras con pelitos blancos en el dorso; patas con una mancha oscura arriba y con pelos largos y pardos, pero los dedos son claros y las garras son crema. Cola muy alargada, peluda, bicoloreada débilmente o no, con pelos pardos claros uniforme que se hacen más densos y oscuros hacia la punta; punta de la cola con un pincel de pelos muy largo. Vientre con la mitad basal de los pelos grises y el resto blanco cremoso.

Aspectos ecológicos. Nocturnos, trepadores, gregarios. Viven en la vegetación boscosa muy densa, baja o media, multiestratificada. Con abundancia de bromelias y epifitas en el dosel. En la cuenca del río Totare se colectó en sitios de alta humedad, hojarasca en gran cantidad, vegetación arbórea y dosel cerrado.

***Neacomys tenuipes* Thomas, 1900**



Orden: Rodentia

Familia: Cricetidae

Subfamilia: Sigmodontinae

Género: *Neacomys*

Especie: *Neacomys tenuipes*

Estado. Raras en algunas regiones, comunes en otras.

Descripción. Parte dorsal parda castaño oscura finamente rayado con negro con $\frac{3}{4}$ basales de los pelos grises y las puntas anaranjadas o amarillentas. Los lados de la cabeza, cuello, hombros y la parte lateral inferior naranja, a menudo de color intenso; pelaje muy uniforme y erizado con pelos espinosos acanalados en el dorso y los flancos, cabeza de coloración similar al dorso y rostro de coloración algo más oscura que la cabeza y con el labio superior blanco o crema anaranjado; ojos medianos; vibras largas, llegan a pasar las orejas. Orejas grandes, redondeadas y dirigidas hacia atrás, algo peludas y pardas oscuras. Manos y patas cubiertas de pelitos muy cortos, dorado crema; garras cubiertas con pelos medianos blancos. Cola un poco más larga que la cabeza y el cuerpo, marcadamente bicolorada, siendo parda muy oscura arriba y blanca debajo. Vientre con pelos más suaves, blancos o crema anaranjados, con la base gris, que se extienden hasta la garganta y la barbilla donde llegan a ser enteramente blancos.

Aspectos ecológicos. Nocturnos; terrestres; solitarios. Viven en la vegetación boscosa densa y alta. Multiestratificada, con abundancia de bromelias y epifitas, con sotobosque intrincado, en los claros del bosque, cerca de arroyos y quebradas. En la cuenca del río Totare se colecta en sitios con vegetación arbustiva, platanillos, dosel semi-abierto, poca hojarasca y pendiente elevada, en algunas ocasiones cerca de nacimientos de agua

Distribución. En los Andes, Cordillera Central y sistema Coriano, entre 150 y 1700m de altura.

Oryzomys sp.

Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: *Oryzomys*



Estado. Comunes a raras

Descripción. Son ratas de tamaño mediano a pequeño: marrones, pardas, rojizas o grises; de pelo suave con la base gris oscura, usualmente no es conspicuamente denso. Las orejas son grandes, escasamente pilosas; las vibrisas largas o cortas; los ojos grandes; el reflejo ocular es amarillo brillante. La cola usualmente es ligeramente mas corta que la cabeza y el cuerpo, pudiendo ser ligeramente más larga, sin pelos, delgada; de un color uniforme o bicolor, pálida por debajo, oscura por arriba, sin la punta blanca. Los pies traseros angostos, usualmente blanco arriba, con la planta negra. La parte ventral es color blanco grisáceo con pelos grises en la base. Pares de mamas: 1 pectoral, 1 poxt-axial, 1 abdominal, 1 inguinal = 4.

Aspectos ecológicos. Nocturnas (*O. caliginosus* que es diurna); son terrestres solitarias. Las ratas arroceras son generalmente más comunes en áreas de denso sotobosque y alrededor de troncos caídos. En la cuenca del río Totare se colectó cerca de troncos caídos o bases de los árboles, gran cantidad de hojarasca y alta humedad.

Distribución. América del Norte y del Sur: desde el S de Estados Unidos hasta N de Argentina.

***Oryzomys alfaroi* J. A. Allen, 1891**



Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae
Subfamilia: Sigmodontinae
Género: *Oryzomys*
Especie: *Oryzomys alfaroi*

Estado. Poco común

Descripción. Son ratas de tamaño pequeño. Variables en color: oscuro, o negro y ligeramente café. Interiormente grisáceo blanco o blanco apagado. Pelo moderadamente corto y uniforme. Orejas usualmente pequeñas rodeadas por pelos negruzcos, algunas veces casi sin pelo. Cola uniformemente oscura o bicolor en aproximadamente $\frac{1}{2}$ de la longitud de la base.

Aspectos ecológicos. Nocturno y terrestre. En la cuenca del río Totare se colectó cerca de troncos caídos o bases de los árboles, gran cantidad de hojarasca y alta humedad.

Distribución. De América Central a Ecuador. De tierras bajas a 3250 m de altitud (usualmente encima de 1000 m). O de Colombia y Ecuador.

***Microryzomys minutus* Tomes, 1860**



Orden: Rodentia

Familia: Cricetidae

Subfamilia: Sigmodontinae

Género: *Microryzomys*

Especie: *Microryzomys minutus*

Descripción. Coloración dorsal parda ocrácea con tonos leonados con los pelos sobresalientes tricoloreados, con los $\frac{3}{4}$ basales grises y plumizos, seguido de una banda ocrácea y las puntas negras o plateadas. Pelaje muy fino, suave y lanudo con la borra muy densa y expuesta. Cabeza de coloración similar al dorso; rostro con numerosas glándulas sebáceas pequeñas; vibrisas numerosas y largas que pasan las orejas. Orejas medianas y grises oscuras con el margen externo cubierto de pelitos negros. Manos y patas cubiertas de pelitos blancos y con manchas oscuras en el dorso; manos con pelos largos que cubren las garras y patas con pelos más cortos; patas ligeramente anchas y con los cojinetes plantares robustos. Cola larga y generalmente unicoloreada. Vientre de coloración similar al dorso y con las puntas de los pelos ligeramente más claras, pardas leonadas y los $\frac{3}{4}$ basales grises oscuros.

Aspectos ecológicos. Nocturnos, terrestres, solitarios. Viven en la vegetación arbustiva, abierta o boscosa rala o densa, baja o media, con abundancia de bromelias, epifitas y helechos, en los claros de bosques, cerca de arroyos y quebradas en suelos muy húmedos formados de turba. En la cuenca del río Totare se colectó un sitio de pendiente elevada, dosel semi-abierto, vegetación arbustiva, lianas y platanillos.

Distribución. Presente en los Andes, cordillera Central y Oriental, entre 1630 y 4000 m de altura.

***Marmosops handleyi* Pine, 1981**



Orden: Didelphimorphia
Familia: Marmosidae
Subfamilia: Marmosinae
Género: *Marmosops*
Especie: *Marmosops handleyi*

Estado. Poco conocido

Descripción. Las partes dorsal y lateral son de color castaño oscuro o pardo; el pelaje es largo y ligeramente lanudo. El antifaz es de color oscuro, las mejillas son de color amarillento o crema mate; la barbilla es de color blanco sucio o crema. La parte ventral presenta coloración gris en la base y de color búfalo, crema, amarillento o blanco sucio en las puntas. Los metatarsales son oscuros y el resto del pie pálido. La cola es peluda en la base, oscura por encima y con pelos indistintos pálidos, mate; las escamas caudales están dispuestas de forma espiral. Las hembras no presentan bolsa marsupial y la región mamaria tiene pelos pigmentados de color rojizo. Los machos tienen el pene bífido, el escroto cubierto de pelaje blanco y no presenta glándula gular.

Aspectos ecológicos. Especie terrestre, nocturna arbórea y solitaria. En la cuenca del río Totare se colectó en sitios de pendiente elevada, cerca de nacimientos de agua, dosel semi-abierto, alta humedad y vegetación arbustiva.

Distribución. En Suramérica. Colombia: en la región Andina: Antioquia: Valdivia. Se encuentran en la cordillera Central a 1400 m de altura.

***Marmosa murina* Linnaeus, 1758**



Orden: Didelphimorphia

Familia: Marmosidae

Subfamilia: Marmosinae

Género: *Marmosa*

Especie: *Marmosa murina*

Estado. Común.

Descripción. La parte dorsal es de color pardo uniforme, pardo sepia, pardo canela mate o castaño brillante, el pelaje es corto y aterciopelado, la base es de color gris. La cabeza es más pálida que el dorso; el antifaz es conspicuo, se extiende hasta el hocico y es de color negro; el rostro, entre los ojos y hasta el rinario, es de color pardo claro; el pelaje de las mejillas y de la barbilla es de color amarillo o naranja pálido hasta la base del pelo; la garganta es de color naranja pálido hasta la base. Las orejas son de tamaño mediano y de color pardo mate a gris oscuro. La parte ventral es de color salmón suave o rosado, amarillo, crema, o amarillo naranja pálido, no blanco, con la base de los pelos de color gris; la región inguinal es más pálida. Las extremidades anteriores y posteriores, externamente, son de color pardo canela con la base gris; las anteriores, internamente, son de color crema amarillento con la base gris, y las posteriores, de color grisáceo matizado de crema. Los pies y las manos son de color blanquecino, pardas pálidas, pardas grisáceas o grises blanquecinas. La cola es poco peluda en la base, aproximadamente en 15mm y el resto es desnudo y de color pardo canela; las escamas caudales tienen forma de diamante y están dispuestas en bandas. Los pelos, tríadas, de la cola son muy pequeños, no pigmentados y menores que la longitud de una escama. Las hembras desarrollan pliegues laterales, los machos poseen el escroto azul o crema y presentan glándula gular.

Aspectos ecológicos. Nocturna, arbórea, terrestre y solitaria. Habita lugares boscosos densos y húmedos, en claros de bosque dominados por platanillo, cerca de nacimientos de agua. En niveles del suelo, bajos o medios del bosque. En la cuenca del río Totare se colectó en un sitio de pendiente alta y cerca de agua.

Distribución. En Colombia: región Pacífica, Andina, Amazonía y de la Orinoquia, en el alto y medio Magdalena, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Vaupés, Vichada. Habita hasta los 1400 m de altitud.