Pedaliodes manis C & R Felder 1867

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano a grande. Palpos cortos y con vellosidades. Antenas con ápice aplanado. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Alas en vista dorsal y ventral de coloración oscura, aunque en esta última presenta una mancha rojiza en el margen anal del ala posterior. Longitud del ala anterior: 25 - 31 mm.

Aspectos ecológicos. Presente tanto en áreas abiertas y bosques de zonas montanas, donde acostumbra volar en el estrato herbáceo y subarbustivo. Generalmente se observa en compañía de especies del mismo género e inclusive de la misma tribu (Pronophilini).

Distribución. En Colombia está presente en la serranía de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y las tres cordilleras andinas entre 1000 – 2500 m (García - Robledo *et al*. 2002). En la cuenca del río Coello en las localidades La Leona (2072 m), Toche (2152 m), Dantas (2441 m), Cristales (2460 m) y Semillas de Agua (3600 m).

Lymanopoda albocinta Hewitson 1861



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Palpos cortos y con vellosidades. Antenas largas con una maza aplanada. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Alas en vista dorsal con una coloración oscura. Ala anterior en vista ventral con diminutas manchas blancas localizadas en el área media y postmedia. Ala posterior con una delgada franja, de color blanco localizada desde el margen costal hasta el anal. Longitud del ala anterior: 22 – 26 mm.

Aspectos ecológicos. Especie presente en zonas de clima frío en pradera y borde de bosque. Acostumbra volar en el estrato arbustivo.

Distribución. En Colombia está presente en las tres cordilleras andinas y la serranía de Perijá entre 1800 – 2800 m (García - Robledo *et al*. 2002). En la cuenca del río Coello en las estaciones Toche (2152 m), Dantas (2441 m) y Cristales (2460 m).

Panyapedaliodes drymaea Hewitson 1858



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción*.* Mariposa de tamaño mediano. Palpos cortos y con vellosidades. Antenas largas con una maza aplanada. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Alas en vista dorsal con una coloración oscura. Ala anterior en vista ventral con la vena subcostal dilatada y con una mancha gris opaca en el margen costal abarcando el área subapical. Longitud del ala anterior. 21 – 25 mm.

Aspectos ecológicos. Especie presente en zonas de clima frío tanto en hábitat de pradera, borde e interior de bosque. Comparte su hábitat con otros satírinos del género ***Pedaliodes, Lymanopoda*** y ***Lasiophila****.*

Distribución. En la cuenca del río Coello en las localidades Dantas (2441 m), Cristales (2600 m) y Semillas de Agua (3600 m).

Pedaliodes wilhelmii Pyrcz 1999



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Palpos cortos y con vellosidades. Antenas largas con ápice aplanado. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Alas en vista dorsal con una franja de color amarillo localizada entre el área media y postmedia, alcanzando el margen costal y distal. Ala posterior en vista ventral con una franja crema que cubre el área media y postmedia. Longitud del ala anterior: 25 – 28 mm.

Aspectos ecológicos. Especie propia de zonas de alta montaña (Páramos), donde habita en áreas abiertas así como en borde de bosque.

Distribución. En la cuenca del río Coello la localidad Semillas de Agua (3600 m).

Pedaliodes peucestas Hewitson 1861

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño a mediano de generalmente de coloración oscura. Presencia de manchas androconiales en la superficie dorsal de las alas anteriores. Presenta una inflamación en las base de las venas Sc y cubitas de las alas anteriores formando una protuberancia visible a simple vista. Longitud del ala anterior: 25 - 28 mm.

Aspectos ecológicos. Es una especie común en climas fríos, presente a veces en los jardines. Casi todas estas especies son negras o pardas y son muy activas, aún en horas en que otras especies no lo son, debido a que sus colores oscuros le ayudan a la absorción de calor. La planta que le sirve de alimento a las orugas es posiblemente el chusque (***Chusquea* sp.)** (Anónimo 1987).

Distribución. En Colombia esta presente en las tres cordilleras andinas entre 2000 a 3000 m. (García – Robledo *et al*. 2002).

En la cuenca del río Coello en la localidad de Toche (2152 m).

Euptychia penelope Fabricius

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño, cabeza con palpos delgados y vellosidades. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Dorsalmente con una coloración café, con un diminuto ocelo en el área subapical del ala anterior y en el área postmedia cercano al margen distal del ala posterior. Ventralmente con franjas cafés y amarillas, además de ocelos en el área submarginal. Longitud del ala anterior: 19 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada tanto en zonas perturbadas (borde) como en áreas abiertas de pradera. Presenta vuelo a la altura del estrato herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello en las localidades Buenos Aires (685 m) Martínez (905 m) Planadas (1641 m) y Cay (1714 m).

Lasiophila zapatosa Westwood 1851



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño grande. Cabeza con palpos oscuros y vellosidades. Antenas terminando en una maza aplanada. Cuerpo con un tórax ancho y de similar tamaño al del abdomen. Alas dorsalmente con una coloración pardo-rojiza con bandas oscuras localizadas desde el área submedia hasta el margen distal. Margen costal del ala anterior con la base engrosada. Longitud ala anterior: 32-35 mm.

Aspectos ecológicos. Mariposa muy activa en las horas del medio día, en zonas frías. Presenta un vuelo muy rápido y un comportamiento arisco. Acostumbra a volar sobre el dosel, aunque se le puede encontrar en el estrato rasante, pasando inadvertida por su coloración críptica. Es frecuente observarla acompañada por otras especies de satírinos del género ***Pedaliodes, Lymanopoda*** *y* ***Corades****.*

Distribución. En Colombia está presente en las tres cordilleras andinas y la serranía de Perijá, entre 2000 - 3500 m. (García – Robledo *et al.* 2002).

En la cuenca del río Coello se encuentra en las localidades La Leona (2072 m), Dantas (2441 m) y Cristales (2460 m).

Steroma bega Westwood 1850



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos oscuros, cortos y con vellosidades. Antenas que terminan en una maza redondeada. Ventralmente, el ala anterior presenta unos parches plateados sobre un fondo negro. Longitud ala anterior 18 mm.

Aspectos ecológicos. Los parches plateados en el revés de sus alas permiten que se confunda con el pantano húmedo (Anónimo 1987). Son propias de zonas de páramo, en donde habita en pajonales.

Distribución En Colombia esta presente en la región andina en la serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1200 - 3650 m. (García – Robledo *et al.* 2002).

En la cuenca del río Coello en la localidad de Semillas de Agua (3600 m).

Corades chelonis Hewitson 1863



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposas de mediano tamaño, dorsalmente posee una coloración parda oscura en el ala anterior con tres manchas de forma irregular de color anaranjado. Antenas de tamaño pequeño y terminan en maza. Presentan palpos labiales y una espiritrompa anaranjada. Abdomen y tórax de coloración pardo oscura. El ala posterior ventralmente es de color café claro con dos líneas que lo cruzan longitudinalmente. El ala posterior posee tres manchas, una café claro y las otras dos blancas. El primer par de patas reducidas. Longitud del ala anterior: 35 – 38 mm.

Aspectos ecológicos. Habita bordes de caminos en zonas frías, en donde se camufla muy bien debido a su apariencia de hoja seca. Presenta un vuelo muy rápido. Comparte su hábitat con otras especies de tierras altas de la misma subfamilia, generalmente de los géneros ***Pedaliodes*** *y* ***Lasiophila****.*

Distribución. En Colombia esta presente en la región andina en la serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1200 - 3650 m (García – Robledo *et al*. 2002).

En la cuenca del río Coello en las localidades Dantas (2441 m) y Cristales (2460 m).

Oressinoma typhla Westwood 1851

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposas de tamaño pequeño a mediano, presenta sólo dos pares de patas ambulatorias por estar reducidas las anteriores, cabeza pequeña, antenas con escamas. Ala posterior con la vena subcubita y a veces con la base costal notablemente dilatada. Longitud del ala anterior 25 - 28 mm.

Aspectos ecológicos. Acostumbra a posarse sobre excrementos animales y liban en plantas de la familia Amaranthaceae. Se le puede encontrar al borde caminos durante las horas de mayor intensidad lumínica. La planta hospedera de sus orugas es una Cyperaceae (De Vries 1987). Vuela tanto en zonas de borde como al interior del bosque en los estratos herbáceos y subarbustivos.

Distribución. En Colombia esta presente en las tres cordilleras andinas, en la serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 1800 y 2500 m (García – Robledo *et al.* 2002).

En la cuenca del río Coello en la localidad Planadas (1641 m).

Euptychia hesione Sulzer 1776

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposas de tamaño mediano. Cabeza con palpos oscuros, cortos y con vellosidades. Antenas con un ápice que termina en una maza redondeada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Dorsalmente con una coloración blanca, con una franja oscura a manera de borde, en el área marginal. Ala anterior con las venas costal y medias con una inflamación pronunciada en la base. Longitud ala anterior: 22 - 25 mm.

Aspectos ecológicos. Especie considerada como bioindicadora de Bosque Secundario de más de 25 años (Fagua *et al.* 1999). Acostumbra volar a la altura del estrato herbáceo y subarbustivo, aunque también puede frecuentar el dosel, junto con mariposas del género ***Heliconius*** y ***Catasticta***.

Distribución. En Colombia esta distribuida en todo el país desde el nivel del mar hasta 1500 m. (García – Robledo *et al* 2002).

En la cuenca del río Coello en las localidades Buenos Aires (685 m.s.n.m), Martínez (905 m), Planadas (1641 m) y Cay (1714 m).

Pedaliodes phaedra Hewitson 1870



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposas de tamaño mediano. Cabeza con palpos oscuros, cortos y con vellosidades. Antenas con un ápice que termina en una maza redondeada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. El ala anterior con una mancha blanca que cruza longitudinalmente el ala. Ala posterior con una mancha blanca cuadrada, localizada entre la vena cubita (Cu_1) y la segunda vena anal. Longitud del ala anterior: 28 - 32 mm.

Aspectos ecológicos. Especie que frecuenta zonas perturbas (borde), así como áreas de praderas de pastos. Presenta un vuelo rápido y a la alturas del estrato herbáceo y subarbustivo.

Distribución. En Colombia presente en la cordillera Central entre 2750 y 3500 m (García - Robledo *et al.*, 2002).

En la cuenca del río Coello en la localidad Semillas de Agua (3600 m).

Pedaliodes poesia Hewitson 1862



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposas de tamaño mediano a grande. Cabeza con palpos oscuros, cortos y con vellosidades. Antenas con un ápice que termina en una maza redondeada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración oscura. Ventralmente con manchas rojas y cremas tanto en el ala anterior como posterior. Longitud del ala anterior: 28 - 32 mm.

Aspectos ecológicos. A esta especie es muy frecuente observarla, en asociaciones de frailejón - pajonales y a veces en áreas de matorrales, con especies de Ericáceas dominantes (Anónimo 1987). Presenta un vuelo rápido y a la altura del estrato subarbustivo.

Distribución. En Colombia presente en la vertiente pacifica y las tres cordilleras andinas entre 2000 y 2700 m. (García - Robledo *et al*. 2002).

En la cuenca del río Coello en las localidades La Leona (2072 m), Dantas (2441 m) y Cristales (2460 m).

Pedaliodes polusca Hewitson 1862



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño grande. Cabeza con palpos delgados y con vellosidades. Antenas con el ápice en forma de una maza aplanada. Cuerpo con un tórax corto y un abdomen delgado. Alas dorsalmente con una coloración oscura. Ala anterior con el margen costal en la base dilatada. Ventralmente el ala posterior con una coloración rojiza oscura, siendo más pronunciado este patrón en el margen anal y distal en donde se ubican dos diminutas manchas en el área marginal. La longitud del ala anterior: 31 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde), así como también en zonas abiertas como prados o pastizales bajos. Presenta un vuelo rápido y a la altura del estrato herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello en Semillas de Agua (3600 m).

***Pedaliodes* sp**. Nov



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos delgados y con vellosidades. Antenas con el ápice en forma de una masa aplanada. Cuerpo con un tórax corto y un abdomen delgado. Alas dorsalmente con una coloración oscura. Ala anterior con el margen costal en la base dilatada. Ventralmente el ala posterior con una mancha rojiza clara, en donde se localizan dos diminutos puntos blancos, cercanos al margen distal. La longitud del ala anterior 26 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde), así como también en zonas abiertas como prados o pastizales bajos. Presenta un vuelo rápido y a la altura del estrato herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello esta reportada para las localidades Cristales (2460 m) y Semillas de Agua (3600 m).

Pseudohaetera hypaesia Hewitson 1854



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa conocida como ala de cristal. Su cuerpo presenta un tórax pequeño y un abdomen largo y delgado. En ambas alas la venación esta marcada con una coloración café oscura y la celda discal es de tipo cerrado. Ala anterior con la vena subcostal con la base dilatada. Ala posterior con un ocelo en el margen distal, además de un borde café que rodea el margen anal. Longitud del ala anterior: 36 - 42 mm.

Aspectos ecológicos. Especie frecuente en interiores de bosque, en lugares donde no hay claros. Presenta un vuelo pausado y a la altura del estrato herbáceo y subarbustivo. Se le puede observar junto con mariposas del género ***Mesosemia*** (Riodinidae) y ***Athesis*** (Ithominae) en las horas de mayor intensidad lumínica.

Distribución. En Colombia esta presente en las tres cordilleras entre 1000 - 2000 m (García – Robledo *et al*. 2002*).* En la cuenca del río Coello en la localidad Planadas (1641 m).

Altopedaliodes cocytia C & R Felder 1867



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos oscuros, delgados y con ápice agudo. Antenas largas terminando en una maza aplanada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración oscura, mientras que ventralmente el patrón es más claro, donde aparecen dos manchas blancas a manera de puntos junto con una franja café rojiza en el área postmedia. Longitud del ala anterior 26 – 28 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde). Presenta un vuelo muy rápido a la altura del estrato herbáceo subarbustivo.

Distribución. En la cuenca del río Coello en la localidad de Toche (2152 m).

Satyrinae sp. 18

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos de color café, delgados y con el ápice agudo. Antenas que terminan en una maza aplanada. Cuerpo con un tórax corto y un abdomen largado. Alas dorsalmente con una mancha café oscura, con el margen costal del ala anterior con la base dilatada. Ventralmente con una coloración más clara. Ala posterior con tres manchas a manera de puntos pequeños localizados entre el área media y postmedia longitud del ala anterior: 25 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada al interior del bosque seco y muy seco tropical. Acostumbra a volar a la altura del estrato herbáceo y rasante, en donde se camuflan muy bien con la hojarasca debido al patrón de coloración críptico que exhiben sus alas ventralmente.

Distribución. En la cuenca del río Coello en las localidades Potrerillo (433 m) y Martínez (905 m).

Satyrinae sp. 19



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos delgados y vellosidades. Antenas cortas con un ápice en forma de maza aplanada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración café oscura. Margen costal del ala anterior con la base engrosada. Ventralmente con el ala posterior con una franja amarilla delgada y otra franja café con seis ocelos localizados en el área postmedia, muy cerca del margen distal y anal. Longitud del ala anterior: 20 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde), presenta un vuelo rápido a la altura del estrato herbáceo. Es muy activa en las horas de mayor intensidad lumínica, volando en compañía de otros satírinos como ***Pedaliodes manis*** y ***Lymanopoda albocinta***.

Distribución. En la cuenca del río Coello en las localidades Dantas (2441 m) y Cristales (2460 m).

Satyrinae sp. 21

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos delgados y antenas que terminan en una maza aplanada. Alas dorsalmente con una coloración café acompañada de un ocelo pequeño en el área subapical del ala anterior, y otro un poco más grande en el área postmedia de la posterior. Ventralmente con dos franjas café rojizas localizadas desde el área submedia hasta la media. Ala anterior con dos ocelos en el área subapical, junto a una mancha amarilla. Ala posterior con cinco ocelos, desiguales en el área postmedia. Longitud del ala anterior: 24 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada tanto en zonas perturbadas (borde), como al interior del bosque en donde acostumbra a volar a la altura del estrato rasante y herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello en las localidades de Potrerillo (433 m), Martínez (905 m) y Cay (1714 m).

Altopedaliodes reissi Weymer 1890

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos negros, delgados y con vellosidades. Cuerpo con un tórax corto y abdomen alargado. Alas dorsalmente con una cloración café oscura. Ala anterior con una mancha blanca, localizada en el área media, que alcanza el área costal. Ventralmente con una coloración clara en el ala anterior y oscura en la posterior. Celda discal de tipo cerrado en ambas alas. Longitud del ala anterior: 23 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas abiertas de pradera, como en pastizales donde acostumbra a volar a la altura del estrato rasante y herbáceo. Comparte su hábitat con otros satyrinos del género ***Pedaliodes***, ***Euptychoides*** y ***Steroma***.

Distribución. En a cuenca del río Coello en las localidades La Leona (2072 m) y Semillas de Agua (3600 m).

Euptychia hermes Fabricius 1775

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos delgados y antenas cortas que terminan en una maza aplanada. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración café. Ventralmente el ala anterior con un ocelo en el área subapical y seis ocelos en el área postmedia del ala posterior. Longitud del ala anterior: 16 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde), en donde acostumbra a volar a la altura del estrato rasante y herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en las localidades Potrerillo (433 m) y Martínez (905 m).

***Yphthimoides* sp**. Forster 1964

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos delgados y vellosidades. Antenas con el ápice en forma de maza aplanada. Alas dorsalmente con una coloración oscura. Ala posterior con dos ocelos desiguales en el área marginal. Ventralmente, el ala anterior con el margen costal en la base dilatada. Ala posterior con seis ocelos casi de igual tamaño, localizados en el área postmedia y marginal. Longitud del ala anterior: 21 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde). Acostumbra a volar a la altura del estrato rasante y subarbustivo. Se le puede observar posada con las alas extendidas entre la hojarasca.

Distribución. En la cuenca del río Coello en la localidad Buenos Aires (685 m).

Eretris decorata C & R Felder



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos negros, delgados y con vellosidades. Antenas cortas con ápice aplanado. Cuerpo con un tórax y un abdomen de similar tamaño. Alas en vista dorsal y ventral con un patrón de coloración oscuro. Ala posterior con una mancha amarilla opaca, localizada desde el área submedia hasta el margen anal, además de pequeñas manchas negras a manera de puntos. Longitud del ala anterior: 24 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde). Presenta un vuelo muy rápido y a la altura del estrato rasante y herbáceo. Se puede observar formando grupos con individuos de la misma especie, además de otros satyrinos como ***Lymanopoda albocinta***, ***Pedaliodes manis*** y ***P. poesía***.

Distribución. En la cuenca del río Coello en la localidad Dantas (2441 m).

Pedaliodes empusa Felder



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos negros, largos y con vellosidades. Antenas terminando en una maza aplanada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración oscura. Celda discal de tipo cerrado. Ventralmente con un patrón de coloración más claro. Ala anterior con el margen costal en la base engrosado, además de una pequeña mancha plateada en el área media. Ala posterior con una mancha plateada alcanzando el margen costal. Longitud del ala anterior: 28 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas perturbadas (borde). Presenta un vuelo rápido a la altura del estrato herbáceo y subarbustivo.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en la localidad Toche (2152 m).

Euptychia calixta Butler 1877



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño, cabeza con palpos delgados y con vellosidades. Antenas cortas con ápice en forma de maza aplanada. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración oscura, sin presentar ningún tipo de mancha (ocelos), margen costal con la base engrosada. Ventralmente con franjas delgadas de color café oscuro además de ocelos en el ala anterior y posterior. Longitud del ala anterior: 20 – 24 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en zonas abiertas de pradera. Presenta un vuelo bajo, a la altura del estrato arbustivo y herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello en las localidades La Leona (2072 m) Toche (2152 m) y Dantas (2441 m).

Euptychia saturnus Butler 1876



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano, cabeza con palpos delgados y con vellosidades. Cuerpo con un tórax y abdomen de similar tamaño. Primer par de patas atrofiado. Alas dorsalmente con una coloración café, con una mancha en forma de ocelo en el área postmedia y marginal del ala posterior. Margen costal con la base engrosada. Ventralmente con bandas crema localizadas desde el margen costal hasta el distal y anal. Ala anterior con un ocelo, ala posterior con cinco ocelos de diferente tamaño, siendo uno más grande ubicado en el área postmedia. Longitud del ala anterior: 23 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada tanto en zonas perturbadas (borde) como también en áreas abiertas de pradera. Presenta un vuelo rápido a la altura del estrato rasante y herbáceo. Se le puede observar junto con otros satírinos del género ***Pedaliodes*** y ***Lymanopoda***.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en las localidades Planadas (1641 m), Laureles (1661 m) y La Leona (2072 m).

Oxeoschistus simplex Butler 1868



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano, Dorsalmente con una coloración oscura, con una banda café clara con puntos negros en el área porstmedia de ambas alas, siendo más ancha en el ala posterior donde termina en el margen anal. Centralmente con manchas crema en el área costal del ala anterior y en el margen submarginal del ala posterior. Longitud del ala anterior: 30 – 34 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en interiores de bosque, siendo activa en horas tempranas del día. Acostumbra volar en los estratos subarbustivo y herbáceo, aunque también se le puede encontrar en el dosel junto con otros satírinos del género ***Corades***, ***Mygona*** y ***Lasiophila.***

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en las localidades La Leona (2072 m) y Toche (2152 m)

Penrosada lanassa C & R Felder 1867



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos delgados y ápice agudo. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración café oscura. Ala anterior con el margen costal en la base engrosado. Ventralmente con una coloración clara con una banda blanca que atraviesa el área media, alcanzando el margen costal y anal, además de dos diminutas manchas negras en el área postmedia. Longitud del ala anterior: 19 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en áreas perturbadas. Presenta un vuelo a la altura de los estratos herbáceo y rasante.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en la localidad Cristales (2460 m).

***Pronophilia* sp** Doubleday 1849

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño grande. Cabeza con palpos delgados y ápice agudo. Cuerpo con tórax y abdomen de similar tamaño. Dorsalmente con una coloración café con manchas blancas en el área subapical a manera de bandas difusas. Ventralmente con un patrón de coloración claro. Celda discal de tipo cerrado en ambas alas. Longitud del ala anterior: 40 – 42 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en áreas perturbadas. Presenta un vuelo a la altura de los estratos herbáceo y rasante.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en la localidad Planadas (1641 m).

Taygetis celia Cramer 1779

Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño grande. Cabeza con palpos delgados con vellosidades. Tórax corto y abdomen alargado. Alas dorsalmente con una coloración café. Ventralmente ala anterior con el margen costal en el área basal engrosado y dos bandas, la primera ancha naciendo de la base hasta el área media y la segunda desde el área media hasta el margen distal y parte de la costa con manchas a manera de ocelos irregulares. Longitud del ala anterior: 36 - 39 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada en el bosque húmedo. Acostumbra volar a nivel del estrato herbáceo y subarbustivo, aunque puede posarse en el estrato rasante donde se camufla con su coloración críptica.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en la localidad Planadas (1641 m).

Lymanopoda obsoleta Westwood 1851



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño mediano. Cabeza con palpos delgados con vellosidades. Tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración café. Ventralmente ala anterior con manchas a manera de pequeños puntos plateados y franjas claras desde el área submedia hasta el margen. Longitud del ala anterior: 25 - 28 mm.

Aspectos ecológicos. Especie encontrada desde áreas perturbadas como bordes de bosque y caminos hasta relictos de bosque montano. Presenta un vuelo rápido y a la altura del estrato herbáceo.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en la localidad Cristales (2460 m).

***Lymanopoda* sp.** Nov Westwood 1851



Superfamilia: PAPILIONOIDEA
Familia: NYMPHALIDAE
Subfamilia: Satyrinae

Descripción. Mariposa de tamaño pequeño. Cabeza con palpos delgados con vellosidades. Tórax y abdomen de similar tamaño. Alas dorsalmente con una coloración café con bandas crema en el área basal y cerca del ápice. Ventralmente con una coloración crema con diminutas manchas en el área postmedia. Longitud del ala anterior: 25 - 28 mm.

Aspectos ecológicos. Este satírino es propio de formaciones de páramo, donde acostumbra volar en hábitat de pradera. Especie poco común con solo un ejemplar reportado para la cuenca.

Distribución. En la cuenca del río Coello se encuentra en la localidad Semillas de Agua (3600 m).